


★予防接種スケジュール表★

R6.4.1～

《 定期予防接種 》

定期の予防接種は、予防接種法によって、対象者および接種時期が以下のとおり決められています。
接種年齢に該当すれば公費での接種ができますが、標準的な接種年齢で接種されることをお勧めします。


予防接種法に基づく接種年齢及び接種間隔に該当しない場合は任意接種(自己負担)となります。



予防接種の種類		接種回数	標準的な接種年齢	定期予防接種の対象者		備考
B C G（結核）		1回	5ヵ月～8ヵ月 至るまでの間	接種年齢（助成期間）	接種間隔	
5種混合 (DTP-IPV：ジフテ リア・破傷風・百日 咳・ポリオ・ヒブ)	I 期初回	3回	生後2ヵ月から生後7ヵ月に至るまでに 開始し、20日～56日までの間隔をあける	2ヵ月～7歳6ヵ月 に至るまでの間	接種後 20日以上 あける	R 6年4月1日より定期接種化 5種混合ワクチンと4種混合ワクチン等との交互接種について 定期接種においては、同一の疾病に対して複数種類のワクチンが利用可能で ある場合であってシリーズとして複数回接種するときは、原則として過去に 接種歴のあるワクチンと同一のワクチンを用いることとしている。
	I 期追加	1回	I 期初回3回目接種終了後 6ヵ月～18ヵ月に達する までの期間		I 期初回3回目接種後 6ヵ月以上 あける	
4種混合 (DTP-IPV：ジフテ リア・破傷風・百日 咳・ポリオ)	I 期初回	3回	2ヵ月～12ヵ月に 至るまでの間	2ヵ月～7歳6ヵ月 に至るまでの間	接種後 20日以上 あける	R 5年4月から接種開始時期が生後2ヵ月～となりました
	I 期追加	1回	I 期初回3回目接種終了後 12ヵ月～18ヵ月に達する までの期間		I 期初回3回目接種後 6ヵ月以上 あける	
麻しん風しん (MR)	I 期	1回	12ヵ月～24ヵ月に 至るまでの間	12ヵ月～24ヵ月 に至るまでの間		
	Ⅱ期	1回	年長児 <u>(小学校就学前の1年間)</u>	年長児 <u>(小学校就学前の1年間)</u>		
水痘 (みずぼうそう)	初回	1回	生後12ヵ月から15ヵ月に 至るまでの間	1歳～3歳未満		*すでに水痘（みずぼうそう）にかかったことがある者は定期接種の対象外となり ます。 （過去に任意で水痘ワクチンの接種を受けたことがある場合は、接種した回数分、 定期接種を受けたものとみなします。）
	追加	1回	初回接種終了後 6ヵ月から12ヵ月に至る までの間隔をあける		初回接種終了後、 3ヵ月以上 あける	
日本脳炎	I 期初回	2回	3歳～4歳に 至るまでの間	6ヵ月～7歳6ヵ月 に至るまでの間	6日以上あける	平成17年度～平成21年度までの積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃し た平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの方は20歳の誕生日の前日まで 不足回数分を接種できます。 また、平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれの方については、第1期 の3回のうち平成22年3月31日までに接種できなかった分について、9歳～1 3歳未満の間であれば公費負担で接種が可能となりました。
	I 期追加	1回	4歳～5歳に 至るまでの間		I 期初回2回目接種後 6ヵ月以上 あけて接種	
	Ⅱ期	1回	9歳～10歳に 至るまでの間	9歳～13歳に 至るまでの間		
2種混合 (DT：ジフテリア・破傷風)		1回	小学6年生	11～13歳未満		
ヒブワクチン	I 期初回	3回	2ヵ月～7ヵ月未満	2ヵ月～5歳未満	27日以上あける (生後12ヵ月に至るまでの間に接種)	【標準的な接種パターン以外】 (初回2回目、3回目の接種は、生後12ヵ月に至るまでの間に行うこと。 それを超えた場合は実施しない。追加接種は最後の初回接種終了後27日 以上あけて1回接種。) 7ヵ月～12ヵ月未満：初回2回、追加1回 12ヵ月～5歳未満：1回
	I 期追加	1回			初回接種終了後 7ヵ月以上 あける	
小児用肺炎球菌 ワクチン	I 期初回	3回	2ヵ月～7ヵ月未満	2ヵ月～5歳未満	27日以上あける (生後24ヵ月までの間に3回接種) *生後12ヵ月を超えて2回目を接種した場合は3回目の 接種は行わない)	【標準的な接種パターン以外】 7ヵ月～12ヵ月未満：初回2回、追加1回 (初回の2回目の接種は生後24ヵ月までの間に接種) (追加接種は、初回接種終了後から60日以上の間隔をあけ、生後1歳以上 に接種) 1歳～2歳未満：2回（60日以上の間隔） 2歳～5歳未満：1回
	I 期追加	1回			初回接種終了後 60日以上 あけ、 生後1歳以上	
子宮頸がん予防 ワクチン	サーバリックス (2価)	3回	中学1年生の間	小学校6年生～ 高校1年生相当の女子	2回目は1回目の接種後から1ヵ月以上 あけて接種 3回目は1回目接種後から6ヵ月以上 あけて接種	【標準的な接種パターン以外】 2回目は1回目の接種後から 1ヵ月以上 あけて接種 3回目の接種は1回目接種後から 5ヵ月以上 、かつ2回目接種後から 2ヵ月 半以上 あけて接種
	ガーダシル (4価)				2回目は1回目の接種後から2ヵ月以上 あけて接種 3回目は1回目接種後から6ヵ月以上 あけて接種	【標準的な接種パターン以外】 2回目の接種は1回目接種後から 1ヵ月以上 あけて接種 3回目接種は2回目接種後から 3ヵ月以上 あけて接種
	シルガード (9価)				2回目は1回目の接種後から2ヵ月以上 あけて接種 3回目は1回目接種後から6ヵ月以上 あけて接種	【標準的な接種パターン以外】 2回目の接種は1回目接種後から 1ヵ月以上 あけて接種 3回目接種は2回目接種後から 3ヵ月以上 あけて接種
	シルガード (9価)	2回	中学1年生の間	小学校6年生～ 15歳の誕生日の 前日（15歳未満） までの女子	初回から2回目までの接種間隔は 5ヵ月以上 あけて接種	初回から 5ヵ月未満で2回目を接種した場合は合計3回接種が必要 となりま す。 15歳になるまでの間に1回目接種を行うことができれば合計2回での接種 完了が可能となります。
B型肝炎ワクチン	ビームゲン	3回	生後2ヵ月～生後1歳に 至るまでの間	1歳に至るまでの間	27日以上の間隔で2回接種	H 28年10月1日より定期接種化
	ヘプタックス	3回			3回目 は 2回目から6日以上あけ、かつ1回目から139日 以上経過していること	
ロタウイルス ワクチン	ロタリックス	2回	生後2ヵ月～出生24週0日に 至るまでの間	出生6週0日 から 出生24週0日まで	(※遅くとも 出生14週6日までに1回目 を接種し、 出生24週0日まで に 2回目 の接種を完了する。 出生24週1日以降は接種することができ ない 。)	R 2年10月1日より定期接種化 対象者：R 2年8月1日生まれ以降の0歳児 (※ロタリックスは出生24週0日まで、 ロタテックは出生32週0日まで)
	ロタテック	3回	生後2ヵ月～出生32週0日に 至るまでの間	出生6週0日 から 出生32週0日まで	(※遅くとも 出生14週6日までに1回目 を接種し、 出生32週0日まで に 3回目 の接種を完了する。 出生32週1日以降は接種することができ ない 。)	

《 接種間隔について 》

予防接種で使うワクチンには生ワクチンと不活化ワクチンがあり、それぞれ接種後に次の予防接種をするまでに一定の間隔をあける必要がありました。
R2年10月1日より、**異なるワクチンの接種間隔**の規定が、**以下の通り変更され一部緩和される**こととなりました。



(ワクチンの種類)

経口生ワクチン
ロタウイルスワクチン

注射生ワクチン
BCG、麻しん風しん(MR)、麻疹、風しん、水痘、おたふくかぜワクチン

不活化ワクチン
2種混合、4種混合、5種混合、日本脳炎、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワクチン、B型肝炎ワクチン、季節性インフルエンザ



*生ワクチン


生きた病原体の毒性を弱めたものでその病気にかかった状態に近い免疫をつくらうとするもの

*不活化ワクチン

病原体を殺し、免疫を作るのに必要な成分を取り出し毒性をなくしてつくったもの

【注意！！】

(異なるワクチンであっても、注射生ワクチンの接種間隔に変更はありません。)



*なお、同じ種類のワクチンを複数回接種する際には、接種間隔は上記スケジュールの通りです。
それぞれ定められた接種間隔（上の表参照）がありますのでご注意ください。